



UK Health
Security
Agency

نشرة للوالدين

سارعوا بتطعيم طفلكم بلقاح شلل الأطفال الآن

ويفضل نجاح برنامج التطعيم ضد شلل الأطفال، لم تحدث أي إصابات طبيعية بشلل الأطفال في المملكة المتحدة على مدار فترة تتجاوز 30 عامًا (سُجلت الحالة الأخيرة في عام 1984) ونجحت أوروبا في القضاء على شلل الأطفال في عام 2003.

لا ينبغي أن يشكّل فيروس شلل الأطفال المكتشف في لندن أي خطر على المطعّمين تطعيمًا كاملاً، ولكن يوجد احتمال ضئيل بأن يتعرّض غير المطعّمين تطعيمًا كاملاً، أو من لا تجيد أجسامهم الاستجابة للقاحات، لخطر الإصابة بشلل الأطفال خلال انتشاره.

وما يطمئنا أننا اكتشفنا هذا الفيروس مبكرًا ونريد أن نتحرك الآن لحماية أكبر عدد ممكن من الأطفال، ولذا نرجو أن تسارعوا بالقدوم فور دعوتكم.

كيف يمكن أن يأخذ طفلنا الجرعة التنشيطية ضد شلل الأطفال؟

ستتصل بكم هيئة الخدمات الصحية (NHS) لتطلب منكم حجز موعد لجرعة طفلكم من لقاح شلل الأطفال.

هل توجد فئات لا يمكنها أخذ اللقاح؟

توجد أسباب قليلة جدًا تمنع الأطفال من أخذ لقاح شلل الأطفال؛ فإذا عانى طفلكم من حساسية خطيرة تجاه تطعيم سابق أو بعض المضادات الحيوية غير الشائعة (النيومايسين أو البوليميكسين أو الستربتومايسين)، فقد يجدر بكم استشارة طبيبك.

ما الفئات التي ستأخذ الجرعة التنشيطية ضد شلل الأطفال؟

يحتاج جميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من سنة إلى 9 سنوات في لندن إلى جرعة من لقاح شلل الأطفال الآن؛ وقد تكون هذه جرعة إضافية من لقاح شلل الأطفال، زيادة على التطعيمات الروتينية، بالنسبة لبعض الأطفال. وقد تكون جرعة أساسية بالنسبة للبعض الآخر.

لماذا سيأخذ طفلنا جرعة تنشيطية ضد شلل الأطفال؟

اكتشفنا فيروس شلل الأطفال من النوع الثاني في عينات مياه الصرف الصحي المأخوذة من شمال لندن منذ فبراير/شباط 2022، وهذا يدل على أنّ الفيروس ينتشر الآن بين الناس، ولعلّ هذا حدث لأنّ نسبة التطعيم بلقاحات الرضع والصغار في لندن دون المستوى المطلوب.

تكمّن غايتنا من إعطاء جرعة إضافية من لقاح شلل الأطفال في تعزيز حماية كل طفل، بداية من أحياء لندن التي اكتُشف فيها الفيروس. ومن المفترض أن يساعد تنشيط المناعة لدى المطعّمين بالفعل على تقليل خطر الفيروس الذي ما يزال منتشرًا.

ما المقصود بشلل الأطفال؟

شلل الأطفال عبارة عن عدوى فيروسية يسببها فيروس يهاجم الجهاز العصبي؛ ويمكن أن يسبب شللًا دائمًا في العضلات. كان يوجد ما يصل إلى 8,000 حالة مصابة بشلل الأطفال في المملكة المتحدة في سنوات الوباء قبل ابتكار لقاح شلل الأطفال.

ما اللقاح الذي سيأخذه طفلنا؟

نستخدم 3 أنواع مختلفة من اللقاحات التي توفر جميعها وقاية ممتازة ضد شلل الأطفال؛ وكلها مستخدمة بالفعل في البرنامج الروتيني وتُعطى لملايين الأطفال سنويًا بكل أمان.

ويكمن الفرق الوحيد بين اللقاحات الثلاثة في أنواع الأمراض المعدية الأخرى التي تقي الإنسان منها؛ فكلها تقي من شلل الأطفال والتيتانوس والدفتيريا، ولكن قد يزيد بعضها أيضًا من وقاية الإنسان من السعال الديكي والتهاب الكبد الوبائي «B». ولا يهم أي نوع من الثلاثة لِقاحات يأخذها طفلكم، إلا إذا فاتته بعض اللقاحات السابقة.

هل توجد آثار جانبية لهذا اللقاح؟

قد يعاني طفلكم من بعض الاحمرار أو التورم أو الألم في موضع الحقنة في الذراع، وعادة ما يختفي ذلك في غضون بضعة أيام. ويندر ظهور كتلة صلبة في موضع الحقنة ولكنها ستتلاشى أيضًا دون تدخل، عادةً خلال بضعة أسابيع.

وفي بعض الأحيان، لا يكون الأطفال على ما يرام ويصبحون سريع الغضب وترتفع درجة حرارتهم ويشعرون بصداع.

كما يمكنكم الإبلاغ عن الآثار الجانبية المشتبه بها للقاحات والأدوية عبر الإنترنت من خلال البحث عن مشروع Yellow Card أو عن طريق تنزيل تطبيق Yellow Card. انظروا أدناه.

حملة الجرعة التنشيطية ضد شلل الأطفال

سيكون اللقاح الذي سيأخذه طفلكم هو اللقاح المناسب لعمره.

الفئة العمرية	لقاحات شلل الأطفال التي ينبغي أن يكون طفلكم قد أخذها بالفعل	لقاحات شلل الأطفال الموصى بها لهذه الحملة
من سنة إلى أقل من 3 سنوات و4 أشهر	3 جرعات من لقاح شلل الأطفال	جرعة تنشيطية واحدة من لقاح شلل الأطفال - (إنفانريكس هيكسا أو فاكسليس) 4 أسابيع على الأقل بعد آخر جرعة أخذها
من 3 سنوات و4 أشهر إلى 9 سنوات	4 جرعات من لقاح شلل الأطفال	جرعة تنشيطية واحدة من لقاح شلل الأطفال - (بوستريكس-آي بي في أو ريفاكسيس) ما لم يكن قد أخذ جرعته التنشيطية المخصصة لمرحلة ما قبل المدرسة خلال الـ 12 شهرًا الماضية



امسح الكود

www.mhra.gov.uk/yellowcard

بعدما يأخذ طفلكم هذه الجرعة الإضافية، فما زال عليكم استكمال الجرعات الروتينية أو أخذها في العمر الموصى به (أو في أقرب وقت ممكن بعد ذلك). فتابعوا ذلك مع طبيبك العام.

يمكنكم قراءة هذه النشرات للتعرف على مزيد من المعلومات:

- تطعيمات الرضع حتى سن 13 شهرًا
 - تطعيمات الأطفال في سن ما قبل المدرسة
 - تطعيمات الشباب
- اقرأوا نشرة معلومات منتج إنفانريكس هيكسا أو نشرة معلومات منتج فاكسليس أو نشرة معلومات منتج بوستريكس-آي بي في أو نشرة معلومات منتج ريفاكسيس للاطلاع على مزيد من التفاصيل حول لقاحكم، والتعرف على الآثار الجانبية المحتملة.

كما يمكنكم الإبلاغ عن الآثار الجانبية المشتبه بها على موقع Yellow card أو عن طريق الاتصال على الرقم: 0800 731 6789 (من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 5 عصرًا من الاثنين إلى الجمعة) www.mhra.gov.uk/yellowcard