



UK Health  
Security  
Agency



## Brochura para os pais

# Receba já a vacina da poliomielite

### **A quem é que a dose de reforço da vacina da poliomielite está a ser disponibilizada?**

Todas as crianças em Londres com idades entre os 1 e 9 anos precisam de receber já uma dose da vacina da poliomielite. Para algumas crianças, esta poderá ser uma dose adicional da vacina da poliomielite, para além das vacinas de rotina. Para outras crianças, poderá simplesmente significar que ficam com as vacinas em dia.

### **Porque é que a dose de reforço da vacina da poliomielite está a ser disponibilizada ao(à) meu(minha) filho(a)?**

Temos vindo a encontrar um poliovírus tipo 2 em amostras dos esgotos recolhidas na zona norte de Londres desde fevereiro de 2022. Isto sugere que o vírus se está a propagar entre as pessoas. Isto deve-se provavelmente ao facto de que a taxa de vacinação em bebés e crianças de primeira infância em Londres é mais baixa do que deveria ser.

Ao administrarmos uma dose adicional da vacina da poliomielite, temos por objetivo reforçar a proteção de cada criança, começando em áreas de Londres onde o vírus foi detetado. O reforço da imunidade nas pessoas já vacinadas também deve ajudar a reduzir o risco do vírus se continuar a propagar.

### **O que é a poliomielite?**

A poliomielite é uma infeção causada por um vírus que ataca o sistema nervoso central e que pode causar paralisia muscular permanente. Antes da introdução da vacina da poliomielite, chegou a haver 8.000 casos de poliomielite no Reino Unido em anos de epidemias.

Devido ao sucesso do programa de vacinação da poliomielite, não há casos de infeções naturais de poliomielite no Reino Unido há mais de 30 anos (o último caso foi em 1984) e a poliomielite foi erradicada da Europa toda em 2003.

O vírus da poliomielite encontrado em Londres não deverá apresentar qualquer risco para as pessoas com a vacina completa. Contudo, uma vez que se está a propagar, há uma pequena probabilidade de que as pessoas sem a vacina completa, ou pessoas que não respondem bem a vacinas, corram o risco de contrair a poliomielite.

As boas notícias são que identificámos este vírus numa fase precoce e queremos agir já para protegermos o maior número de crianças possível. Pedimos-lhe que venha com o(a) seu(sua) filho(a) assim que o(a) convidarmos.

### **Como é que o(a) meu(minha) filho(a) pode receber a dose de reforço da poliomielite?**

O serviço nacional de saúde (NHS) contactá-lo(a)-á para agendar uma consulta para a vacina da poliomielite da criança.

### **Há pessoas que não podem receber a vacina?**

Há muito poucos motivos que impeçam as crianças de receber a vacina da poliomielite. Se a criança tiver tido uma reação alérgica grave a uma prévia vacina ou a certos antibióticos menos comuns (neomicina, polimixina ou estreptomina), poderá querer consultar o seu médico.

## Que vacina está a ser disponibilizada ao(à) meu(minha) filho(a)?

Há 3 tipos diferentes de vacinas que proporcionam uma proteção excelente contra a poliomielite e que já são utilizadas no programa de rotina e administradas de forma segura a milhões de crianças todos os anos.

A única diferença entre as 3 vacinas consiste nas outras infeções contra as quais proporcionam proteção. Todas proporcionam proteção contra a poliomielite, tétano e difteria. Contudo, algumas também poderão proporcionar proteção adicional contra a tosse convulsa e hepatite B. É irrelevante qual das 3 vacinas a criança vai receber, a não ser que não tenha recebido alguma das vacinas anteriores.

## Esta vacina tem algum efeito secundário?

A criança poderá ter alguma vermelhidão, um inchaço ou sensibilidade no braço onde recebeu a injeção, que desaparecerão normalmente dentro de alguns dias. Em casos raros, poderá surgir um caroço no mesmo local, mas que desaparecerá também naturalmente após algumas semanas.

Ocasionalmente, a criança poderá ficar indisposta e irritadiça e ter febre e dores de cabeça.

Também pode transmitir informações sobre suspeitas de efeitos secundários das vacinas ou medicamentos ao fazer uma pesquisa pelo esquema Yellow Card ou ao descarregar a aplicação Yellow Card. Ver abaixo.

## Campanha da dose de reforço da poliomielite

A vacina que lhe está a ser disponibilizada será a vacina certa para a idade da criança.

Grupo etário	Vacinas contra a poliomielite que a criança já deverá ter recebido	Vacinas da poliomielite recomendadas para esta campanha
1 ano até menos de 3 anos e 4 meses	3 doses da vacina da poliomielite	Uma só dose de reforço da vacina da poliomielite – (Infanrix hexa ou Vaxelis). Pelo menos 4 semanas depois da última dose
3 anos e 4 meses até 9 anos	4 doses da vacina da poliomielite	Uma só dose de reforço da vacina da poliomielite – (Boostrix-IPV ou Revaxis), a não ser que tenha recebido a sua dose de reforço pré-escolar nos últimos 12 meses

Depois de a criança receber esta dose adicional, continuará a ter de completar as doses de rotina à idade recomendada (ou assim que possível depois da idade recomendada). Consulte o seu posto médico.

### Para mais informação, pode consultar as seguintes brochuras:

- [Imunizações para os bebés até aos 13 meses](#)
- [Imunizações para as crianças em idade pré-escolar](#)
- [Imunizações para os jovens](#)

Leia a bula da [Infanrix Hexa](#) ou [Vaxelis](#), a bula da [Boostrix-IPV](#) ou a bula da [Revaxis](#) para mais informação sobre a sua vacina, incluindo os possíveis efeitos secundários.



Leia-me

[www.mhra.gov.uk/yellowcard](http://www.mhra.gov.uk/yellowcard)

Também pode transmitir informações sobre suspeitas de efeitos secundários no sítio Web do Yellow card ou ao telefonar para o número 0800 731 6789 (de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 17h00) [www.mhra.gov.uk/yellowcard](http://www.mhra.gov.uk/yellowcard)