



UK Health  
Security  
Agency



## Folleto para los padres

# Vacúnesse ya contra la poliomielitis

### ¿A quién se le ofrece la vacuna adicional contra la poliomielitis?

Todos los niños de 1 a 9 años en Londres deben recibir una dosis de la vacuna contra la poliomielitis ahora. En el caso de algunos niños, puede tratarse de una dosis adicional de la vacuna contra la poliomielitis, además de sus vacunas habituales. En otros niños puede ser simplemente una puesta al día.

### ¿Por qué se le ofrece a mi hijo una vacuna adicional contra la poliomielitis?

Desde febrero de 2022, hemos hallado un virus de la polio de tipo 2 en muestras de aguas residuales tomadas en el norte de Londres. Esto sugiere que el virus se está propagando entre las personas. Esto probablemente ha sucedido porque la adopción de la vacuna para bebés y niños pequeños en Londres es más baja de lo que debería ser.

Mediante la administración de una dosis adicional de la vacuna contra la poliomielitis pretendemos aumentar la protección de cada niño, empezando por las zonas de Londres donde se ha detectado el virus. Reforzar la inmunidad de los que ya están vacunados también debería ayudar a reducir el riesgo de que el virus siga propagándose.

### ¿Qué es la poliomielitis?

La poliomielitis es una infección causada por un virus que ataca el sistema nervioso y puede causar una parálisis permanente de los músculos. Antes de que se introdujera la vacuna contra la poliomielitis, había hasta 8000 casos de poliomielitis en el Reino Unido en años de epidemia.

Gracias al éxito del programa de vacunación contra la poliomielitis, no ha habido casos de infección natural de poliomielitis en el Reino Unido durante más de 30 años (el último caso fue en 1984) y la poliomielitis fue erradicada de toda Europa en 2003.

El virus de la poliomielitis encontrado en Londres no debería suponer ningún riesgo para quienes están totalmente vacunados. Sin embargo, mientras se propague, existe una pequeña posibilidad de que quienes no hayan sido totalmente vacunados, o quienes no puedan responder bien a las vacunas, corran el riesgo de contraer la poliomielitis.

La buena noticia es que hemos detectado este virus a tiempo y queremos actuar ya para proteger al mayor número de niños posible. Por favor, vengan tan pronto como se les invite a hacerlo.

### ¿Cómo puede mi hijo recibir la vacuna adicional contra la poliomielitis?

El NHS se pondrá en contacto con ustedes para pedirles que concierten una cita para la vacuna contra la poliomielitis de su hijo.

### ¿Hay alguien que no pueda recibir la vacuna?

Hay muy pocos motivos por los cuales los niños no puedan recibir la vacuna contra la poliomielitis. Si su hijo tuvo una reacción alérgica grave a una vacunación anterior o a ciertos antibióticos poco comunes (neomicina, polimixina o estreptomina), debe consultar con su médico.

## ¿Qué vacuna se le ofrece a mi hijo?

Estamos utilizando 3 tipos diferentes de vacunas que proporcionan una excelente protección contra la poliomielitis: ya se utilizan en el programa de rutina y se administran con seguridad a millones de niños cada año.

La única diferencia entre las tres vacunas son las otras infecciones contra las que protegen. Todas ellas protegen contra la poliomielitis, el tétanos y la difteria, pero algunas también pueden completar la protección contra la tos ferina y la hepatitis B. No importa cuál de las tres vacunas reciba su hijo, a menos que se haya saltado algunas vacunas anteriores.

## ¿Tiene efectos secundarios esta vacuna?

Su hijo puede tener algo de enrojecimiento, hinchazón o sensibilidad en el brazo donde le pusieron la inyección y suele desaparecer en unos días. En raras ocasiones, puede aparecer un bulto duro en el mismo lugar, pero este también desaparecerá por sí solo, normalmente en unas semanas.

A veces, los niños pueden sentirse mal e irritables y presentar fiebre y dolor de cabeza.

También puede informar online acerca de sus sospechas de efectos secundarios de las vacunas y los medicamentos buscando el sistema de Yellow Card (tarjeta amarilla) o descargando la aplicación de Yellow Card. Ver a continuación.

## Campaña de refuerzo contra la poliomielitis

La vacuna que le ofrezcan será la adecuada para la edad de su hijo.

Grupo de edad	Vacunas contra la poliomielitis que su hijo ya debería haber recibido	Vacunas contra la poliomielitis recomendadas para esta campaña
De 1 a menos de 3 años y 4 meses	3 dosis de vacuna contra la poliomielitis	Una única vacuna adicional contra la poliomielitis - (Infanrix hexa o Vaxelis). Al menos 4 semanas después de la última dosis
De 3 años y 4 meses a 9 años	4 dosis de vacuna contra la poliomielitis	Una única vacuna adicional contra la poliomielitis (Boostrix-IPV o Revaxis) a menos que haya recibido su vacuna adicional preescolar en los últimos 12 meses

Después de que su hijo haya recibido esta dosis adicional, todavía tiene que finalizar o ponerse al día con las dosis rutinarias a la edad recomendada (o tan pronto como sea posible después). Consulte a su médico de cabecera.

### Para más información, pueden leer estos folletos:

- [Inmunizaciones para bebés de hasta 13 meses](#)
- [Inmunizaciones para niños en edad preescolar](#)
- [Inmunizaciones para los jóvenes](#)

Lean los prospectos de información del producto (PIL) de [Infanrix Hexa](#) o [Vaxelis](#), o de [Boostrix-IPV](#) o [Revaxis](#) para obtener más detalles sobre su vacuna, incluidos los posibles efectos secundarios.



También puede comunicar sus sospechas de efectos secundarios en la web de Yellow Card o llamando al 0800 731 6789 (de 9 a 17 horas de lunes a viernes) [www.mhra.gov.uk/yellowcard](http://www.mhra.gov.uk/yellowcard)